

T. Kučera: Rašeliniště severovýchodu USA, tentokrát nejen pohledem střeoevropské geobotaniky (Živa 2024, 1: 20–23)

Tab. 1 Rody a druhy vřesovcovitých keřů a keříčků (*Ericaceae*) zastoupené na severovýchodě USA a v severozápadní, střední až východní Evropě. Poznámky (*) a synonyma (\$, !) jsou uvedeny ve sloupci Poznámka. Rody uvedené v závorce se vyskytují v teplejších jižních oblastech mimo Novou Anglii, stejně tak druhy širších rodů zde neuvedené. Podle: M. L. Fernald (ed.): *Gray's Manual of Botany* (Portland, Oregon: Dioscorides Press, 1991)

Rod	Severovýchod USA – Nová Anglie	Severozápadní a střední Evropa	Poznámka
<i>Andromeda</i>	<i>glaucophylla</i>	<i>polifolia</i>	
<i>Arctostaphylos</i>	<i>uva-ursi</i>	<i>uva-ursi</i>	
<i>Arctous</i>	(celkem 2 druhy) <i>alpina</i>	<i>alpina</i>	
<i>Calluna</i>		<i>vulgaris</i>	
<i>Cassiope</i>		<i>tetragona</i>	
<i>Empetrum</i>	<i>nigrum, atropurpureum</i>	<i>nigrum, hermaphroditum</i>	
<i>Epigaea</i>	<i>repens</i> var. <i>glabrifolia</i>		
<i>Erica</i>		<i>carnea, cinerea, tetralix, vagans*, ciliaris*, erigena*, mackaiana*</i>	* introdukce
<i>Gaultheria</i>	<i>hispidula, procumbens</i>		
<i>Gaylussacia</i>	(celkem 4 druhy) <i>baccata, frondosa</i>		
<i>Harrimanella</i> \$	<i>hypnoides</i>	<i>hypnoides</i>	\$ <i>Cassiope</i>
<i>Chamaedaphne</i> \$	<i>calyculata</i>	<i>calyculata</i>	\$ <i>Cassandra</i>
<i>Kalmia</i>	<i>angustifolia, latifolia, polifolia</i>		* introdukce
(<i>Leiophyllum</i>)	<i>buxifolium</i>		
<i>Leucothoe</i>	(celkem 4 druhy) <i>racemosa</i>		
<i>Loiseleuria</i>	<i>procumbens</i>	<i>procumbens</i>	
<i>Lyonia</i>	(celkem 3 druhy) <i>ligustrina</i>		
(<i>Menziesia</i>)	<i>pilosa</i>		
(<i>Oxydendrum</i>)	<i>arboreum</i>		
<i>Phyllodoce</i>	<i>coerulea</i>	<i>coerulea</i>	
(<i>Pieris</i>)	<i>floribunda</i>		
<i>Rhododendron</i>	(celkem 14 druhů) <i>canadense, groenlandicum\$, lapponicum, maximum, nudiflorum, roseum, viscosum</i>	<i>ferrugineum, hirsutum, lapponicum, luteum*, ponticum*, tomentosum\$!</i>	* introdukce \$ <i>Ledum</i> ! <i>palustre</i>
<i>Rhodothamnus</i>		<i>chamaecistus</i>	
<i>Vaccinium</i>	(celkem 22 druhů) <i>alpinum*, angustifolium, atrococcum, caesium, caespitosum, corymbosum macrocarpon, myrtilloides, ovalifolium, oxycoccus, uliginosum, vitis idaea</i>	<i>myrtilus, uliginosum, vitis idaea, oxycoccus, microcarpum, gaultheroides</i>	* <i>uliginosum</i> ssp. <i>alpinum</i>
(<i>Zenobia</i>)	<i>pulverulenta</i>		