



1 Trilobit *Agerina quadrata* z fezouatských břidlic. Foto L. Laibl

houbovci – Porifera  
konulárie – Conulariida  
graptoliti – Graptolithina  
ostnokožci – Echinodermata  
pralilijice – Eocrinoidea  
stylophorani – Stylophora  
strunatci – Chordata  
konodonti – Conodonta  
paleoskolecidi – Palaeoscolecida  
lobopodi – parafyletická skupina  
zahrnující rané zástupce kmenových  
linií drápkovců (Onychophora),  
členovců (Euarthropoda)  
a pravděpodobně také želvušek  
(Tardigrada)  
členovci – Euarthropoda  
radiodonti – Radiodonta  
trilobiti – Trilobita  
nektaspididi – Nektaspidida  
cheloniellidi – Cheloniellida  
aglaspididi – Aglaspidida  
marrellomorfové – Marrellomorpha  
marrellidi – Marrellida  
klepítkatci – Chelicerata  
ostrorepi – Xiphosura

synziphosuridi – Synziphosurida  
eurypteridi – Eurypterida  
korýši – Pancrustacea  
thylacocephalové – Thylacocephala  
lasturnatky – Ostracoda  
mechovky – Bryozoa  
ramenonožci – Brachiopoda  
měkkýši – Mollusca  
přilipkovci – Monoplacophora  
plži – Gastropoda  
mlži – Bivalvia  
hlavonožci – Cephalopoda  
ortokonní hlavonožci – hlavonožci  
s přímou vnější schránkou  
chitínovci – Chitinozoa  
kroužkovci – Annelida  
eldonie – Eldonida  
řasy – v článku použito ve smyslu  
pro všechna autotrofní Eukaryota  
s výjimkou Embryobionta  
mikrobiální povlaky – Archaea  
a Bacteria